

## Protocollo Infection Control - Scheda 3

### Applicare le seguenti indicazioni:

- ☐ Visitare i casi sospetti di nCoV in un'area separata dagli altri pazienti
- ☐ Ospedalizzare il paziente in isolamento in un reparto di Malattie Infettive possibilmente in stanza singola facendo indossare al paziente una mascherina chirurgica se riesce a tollerarla
- ☐ Limitare il numero di operatori sanitari, di familiari e di visitatori a contatto con il caso e registrare di seguito i contatti

OPERATORI SANITARI: .....

.....

.....

.....

FAMILIARI E VISITATORI: .....

.....

.....

.....

### Applicare le precauzioni di isolamento da contatto e trasmissione per via aerea:

- ☐ Mascherina e protezione facciale
- ☐ Camice impermeabile a maniche lunghe non sterile e guanti
- ☐ Mascherina FFP2 in caso di procedure che possano generare aerosol

Si raccomanda di utilizzare strumenti monouso e strumentazioni portatili per evitare di muovere il paziente. Se necessario trasportare il paziente fuori della stanza di isolamento, usare percorsi predeterminati per minimizzare la possibile esposizione di personale sanitario, altri pazienti e visitatori.

Qualora il paziente venga posto in ISOLAMENTO DOMICILIARE, sia il paziente che i familiari devono essere istruiti per applicare le precauzioni standard di biosicurezza, quelle per prevenire la trasmissione per aerosol e per contatto.

L'OMS raccomanda di utilizzare i seguenti disinfettanti: alcol etilico 70% per gli strumenti, acqua, detergente comune e sodio ipoclorito o altro disinfettante per la pulizia di ambienti e superfici.